

	AMNIOMTOMI		
	SOP	No. Dokumen :210/ SOP-UKP/2024	
		No. Revisi :	
		Tgl. Terbit :20 mei 2024	
		Halaman : 1/3	
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			<u>Dina Inari Memoriny, AMK</u> NIP.19851106201001202 3
1. Pengertian	Suatu tindakan pemecahan ketuban yang dilakukan sesuai indikasi		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan amniomtomi pada persalinan		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Pulau Tiga No 016 /PKM/2024, Pedoman / Panduan SOP, Kerangka acuan Kegiatan Penyelenggara UKP		
4. Referensi	JNKP-KR, 2012, <i>Asuhan Persalinan Normal Dan Inisiasi Menyusui Dini</i> , JHPIEGO Kerja Sama Save The Children Federation Inc-US. Modul. Jakarta.		

5. Langkah-langkah	A. Persiapan Diri - Menyiapkan alat - Memecah ketuban 1 buah - Sarung tangan DTT / steril 1 pasang - Kapas DTT dan air DTT dalam kom secukupnya - Bengkok - Larutan klorin 0,5% - Patograf - Pena - Pinnards/petoskop/Doppler - Jam yang mempunyai jarum detik - Melakukan informed consent - Mencuci kedua tangan - Memakai sarung tangan DTT atau steril B. Pelaksananan Tindakan - Melakukan tpemeriksaan dalam diantara kontraksi Dengan hati-hati,raba dengan hati-hati selaput ketuban untuk memastikan bahwa kepala telah masuk dengan baik dan bahwa tali pusat dan atau bagian-bagian tubuh ynag kecil dari bayi tidak bisa dopalpasi. Jika tali pusat atau bagian-bagian kecil dari bayi bisa di palpasi jangan pecahkan selaput ketuban.lakukan langkah-langkah kegawat daruratan dan rujuk segera. - Memecahkan ketuban dengan menggunakan tangan yang lain,tempatkan pemecah ketuban dengan lembut kedalam vagina dan pandu klem dengan jari tangan yang digunakan untuk pemeriksaan hinga mencapai selaput ketuban. - Memecahkan selaput ketuban dengan memegang ujung klem di antara ujung jari pemeriksaan,gerakan jari dengan lembut untuk menoreh selaput ketuban hingga pecah. - Mengeluarkan klem dengan tangan yang lain,tepatkan kedalam larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasikan, biarkan jari tangan memeriksa tetap di dalam vagina untuk mengentahui penurunan kepala jani dan memastikan bahwa tali pusat atau bagian kecil dari bayi tidak teraba.swtwlah memastikan penurunan kepala dan tidak ada tali pusat serta bagian-bagian tubuh bayi yang kecil,keluar tangan pemeriksaan secara lembut dalam vagina. - Menilain estimasi jumlah dan warna cairan ketuban,periksa apakah ada mekonium atau darah (lebih bnyak dari bercak bercampur darah yang normal), jika mekonium atau darah terlihat, lakukan langkah-langkah kegawat daruratan. C. Pasca Tindakan - Mencelupkan sarungn tangan kedaslam llarutan klorin 0,5% lalu lepaskan sarung tangan dan biarkan terendam dilarutan klorin 0,5% Selma 10 menit. - Mencuci kedua tangan - Melakukan pemantauan ulang dj - Mencatat pada fatograp waktu dilakukanyan pemecahan selaput warna air ketuban dan dj.
---------------------------	--

6. Bagan Alir	-			
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	-			
8. Unit terkait	Semua Unit Pelayanan.			
9. Dokumen terkait	-			
10. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diperlakukan